



RUCHETTES

Dans la mesure du possible, il faut éviter de constituer de nouvelles ruchettes après la mi-juillet. Il faudra veiller à ce que les ruchettes soient bien nourries pour qu'elles puissent se développer en ruche avant l'hivernage.

RÉCOLTE D'ÉTÉ

• Attention aux canicules

Il faut éviter de récolter les hausses en période de canicule. Par temps trop chaud, les abeilles apportent de l'eau dans la ruche pour la refroidir. Le séchage du miel est inefficace car les nuits sont trop chaudes et les abeilles ne peuvent assécher l'air correctement. Le miel operculé n'est pas une garantie de miel sec. Dans de telles périodes, l'humidité du miel peut dépasser 20 % sous opercules...

• Contrôle de l'humidité

Nous vous conseillons vivement de contrôler l'humidité du miel des hausses avant de l'extraire. S'il est au-dessus de 18 %, il faut le sécher (voir A&C n° 117). Une fois extrait, seul un matériel de type professionnel peut vous permettre de déshumidifier votre miel.

• Ensemencement

Les miels d'été sont souvent assez instables. Il est conseillé de les ensemencer avec du miel récolté au printemps. Le plus simple est de mélanger au miel fraîchement extrait par exemple 5 % d'un miel de printemps que l'on aura ramolli sans le refondre pour le mélanger.

FLORAISONS

En Ardenne, il est toujours possible de réaliser une miellée sur épilobes dans les zones de coupe.

Il est possible de transhumer sur phacélie, même si cette année, les surfaces semblent moins importantes que lors des années précédentes.

Par contre, on peut s'attendre à avoir une floraison importante des couvertures hivernales des sols (moutardes, trèfles, phacélies...) suite à une récolte très précoce des escourgeons.

JUILLET

D 1

L 2

M 3

M 4

J 5

V 6

S 7

D 8

L 9

M 10

M 11

J 12

V 13

S 14

D 15

L 16

M 17

M 18

J 19

V 20

S 21

D 22

L 23

M 24

M 25

J 26

LIBRAMONT 27

LIBRAMONT 28

LIBRAMONT 29

LIBRAMONT 30

M 31

AOUT

M 1

J 2

V 3

S 4

D 5

L 6

M 7

M 8

J 9

V 10

S 11

D 12

L 13

M 14

Assomption 15

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M 21

M 22

J 23

V 24

S 25

D 26

L 27

M 28

M 29

J 30

V 31

NOURRISSEMENT

Juste après la récolte des hausses, un nourrissage est nécessaire pour éviter la famine. Pour voir comment réaliser cette opération, référez-vous à l'article p.12.

TRAITEMENT D'ÉTÉ

• Placement du Thymovar

Le traitement d'été avec le Thymovar doit se faire après le retrait des hausses (hors période de miellée). Pour rappel, les ruchettes recevront un ruban coupé en deux (dans le sens de la longueur). Pour une ruche Dadant, trois demi-rubans seront déposés sur le haut des cadres en rond autour du couvain. Deux rubans seront nécessaires pour une ruche sur deux corps. Dans tous les cas, l'idéal est de pouvoir laisser un petit espace entre les rubans et le couvre-cadres.

Les rubans seront laissés trois à quatre semaines. Ils seront renouvelés pour une période identique. Attention, le double traitement est indispensable pour assurer une protection suffisante des abeilles d'hiver.

Notez qu'il faut retirer les rubans si la température dépasse 30°C.

• Suivi des varroas

Il est toujours utile de vérifier les chutes de varroas en période de traitement. Cela vous donne une idée du nombre approximatif de varroas présents dans votre ruche. Un traitement au Thymovar a généralement une efficacité allant de 70 à 95 %.

RUCHES

Un bilan de l'état des ruches est nécessaire pour programmer les réunions et les éventuels renouvellements de reines à prévoir en fin de saison.